

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 21-7-75068062

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F.

ET FRANCHE-COMTÉ - COTE-D'OR - SAONE-ET-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAONE - TERRITOIRE DE BELFORT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 21206 BEAUNE - Tél. (80) 22.19.38

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DUON 3405.12 K

ATTENTION : Notre nouvelle
adresse postale :
Z.I. Nord - 21206 BEAUNE

Bulletin n° 42 - Juillet 1975

15 Juillet 1975

V I G N E

TORDEUSES (Cochylis-Eudémis) : Le deuxième vol a commencé très faiblement début juillet dans les secteurs les plus précoces. Il a atteint une certaine intensité dans le Beaujolais (ROMANE-CHE-THORINS) mais dans l'ensemble il reste peu important. Compte-tenu des conditions climatiques actuelles, les premières éclosions de chenilles sont à prévoir dans les prochains jours en situations favorables.

En conséquence nous conseillons un traitement insecticide :

- dès réception dans le sud de la SAONE-et-LOIRE
- de la fin de cette semaine au début de la semaine prochaine dans les autres vignobles.

Pour répondre aux nombreuses questions des viticulteurs, nous apportons des précisions sur les insecticides homologués ou en autorisation provisoire de vente.

- Quelques uns, type carbaryl, permettent d'agir en traitement préventif appliqué avant l'éclosion des oeufs.

- La plupart des autres, destinés surtout à la lutte curative, sont à utiliser après la majorité des éclosions c'est-à-dire après les premières pénétrations. Parmi ceux-ci certains ont un effet de choc très efficace et se dégradent assez rapidement (type parathion). D'autres agissent moins brutalement mais ont une plus longue rémanence (type méthomyl).

Aussi bien en lutte préventive que curative la réussite du traitement est étroitement liée aux conditions d'application et nous recommandons à nouveau une pénétration parfaite des grappes.

Pour ceux qui disposent du matériel d'application nécessaire, le poudrage en traitement spécifique ou complémentaire présente un intérêt certain. Il existe diverses spécialités pour poudrage à base de bromophos, carbaryl, malathion, parathion (éthyl et méthyl), phosalone sans oublier les soufres insecticides.

BOTRYTIS : Le stade fermeture de la grappe sera atteint dans les prochains jours. Les viticulteurs qui ont entrepris le programme de lutte spécifique contre le botrytis pourront associer ce traitement à celui contre les Tordeuses.

M A I S

PYRALE : La liste des spécialités commerciales publiée dans notre bulletin n° 41 du 7 courant est à compléter ainsi : fénitrothion (3 % de matière active) : Sumifène granulé

PUCERONS : Nous manquons de connaissances sur la nuisibilité des pucerons sur maïs et la rentabilité d'une intervention chimique n'est pas acquise. La croissance rapide du maïs devrait permettre à ce dernier de résister, dans une certaine mesure, aux attaques de pucerons ; enfin à cette époque de l'année un grand nombre d'auxiliaires sont présents dans les cultures. Pour ces diverses raisons les traitements aphicides sur maïs sont déconseillés.

Les Ingénieurs :

J. SONDEY - J. C. RICHARD

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET

P 480